

Nuove norme sul recupero di uccelli selvatici e sulla carne degli uccelli selvatici

Norme del 2012 per il Controllo della Selvaggina

Per il cacciatore responsabile, il recupero e l'utilizzo della selvaggina cacciata è pratica standard e fa parte del piacere della ricerca, del recupero e del consumo della selvaggina.

Tuttavia i cacciatori irresponsabili non fanno alcun tentativo per recuperare le anatre cacciate e questo comporta uno spreco di selvaggina e effetti negativi sul benessere degli animali.

Per assicurare che non ci sia spreco di selvaggina, le Norme del 2012 per il Controllo della Selvaggina (*Wildlife (Game) Regulations 2012*) sono state modificate per includere due nuove norme che prevedono che i cacciatori recuperino immediatamente gli uccelli abbattuti dopo aver sparato e che conservino almeno la carne del petto dell'uccello recuperato.

Recupero della selvaggina

È stata introdotta una nuova norma che prevede che i cacciatori compiano ogni ragionevole sforzo per il recupero immediato della selvaggina abbattuta.

Questo è valido per tutte le anatre, per la Quaglia delle Stoppie e per gli uccelli selvatici non nativi (es. fagiani, pernici e quaglie).

Per uccello abbattuto si intende un uccello che è stato portato a terra (o in acqua) dopo che gli si è sparato, o un uccello al quale si è sparato mentre si trovava sul terreno.

Una volta che l'uccello è stato abbattuto, il cacciatore deve concentrarsi esclusivamente su quello e compiere ogni ragionevole sforzo per recuperarlo immediatamente. Non dovete continuare a sparare ad altri uccelli.

Il recupero immediato è importante per assicurare che il cacciatore rimanga concentrato sull'uccello selvatico abbattuto.

Questo minimizzerà la perdita di uccelli abbattuti e assicurerà che uccelli recuperati ancora vivi possano essere uccisi immediatamente..

In rispetto delle norme vigenti, qualsiasi capo di selvaggina recuperato ancora in vita, deve essere ucciso immediatamente.

Strategie per il recupero degli uccelli selvatici

Al fine di avere successo nella caccia e per agevolare il recupero della selvaggina si consiglia di studiare delle strategie di recupero.

Ecco i fattori da prendere in considerazione per lo sviluppo di un'efficace strategia di recupero::

- Identificate luoghi di caccia o zone di tiro nelle quali la selvaggina abbattuta possa essere facilmente recuperata – evitate di cacciare in aree con fitta vegetazione
- Non date per scontato che gli uccelli abbattuti siano morti sul colpo
- Una volta che un uccello è stato colpito e abbattuto, smettete di sparare e recuperate immediatamente l'uccello abbattuto

- Studiate le zone di caccia e le caratteristiche ambientali associate
- Servitevi di attrezzature che vi aiutino nel recupero di uccelli abbattuti (queste possono includere cani da caccia, cariche *swatter loads*, barche).

Non sparate a più di un uccello alla volta

Se si presenta un altro uccello dietro all'uccello abbattuto, non dovete sparargli.

Oltre ad essere diventato illegale, ciò distoglierebbe la vostra attenzione dal recupero dell'uccello abbattuto e gli darebbe l'opportunità di fuggire se ferito.

Anziché recuperare con successo l'uccello abbattuto, potreste finire con il ferirne e perderne due.

Se si presenta una coppia di uccelli, questi possono essere presi entrambi (a 'doppietta') a patto che uno degli uccelli non sia stato abbattuto. Tuttavia, per minimizzare la possibilità di ferimenti, si raccomanda di concentrarsi unicamente sulla cattura di un uccello. Se colpite un uccello, utilizzate immediatamente il secondo colpo per finirlo, se ferito.

Strategie per minimizzare ferimenti e per migliorare le capacità di recupero:

- Sparate solo agli uccelli entro la vostra effettiva capacità di tiro. Per la maggior parte delle persone questa è a meno di 30 metri. Sparare oltre la propria effettiva capacità di tiro è la causa principale di ferimenti.
- Sparate a uccelli solitari o a gregari. Non sparate agli uccelli capostormo o in mezzo allo stormo.
- Evitate di abbattere uccelli in zone di folta vegetazione.
- Usate sempre la giusta combinazione di strozzatura e pallini, e testate la rosata..
- Si raccomanda di riservare il secondo colpo all'uccello abbattuto.
- Portate con voi e usate pallini *swatter loads*, per finire gli uccelli feriti, quando questo possa essere fatto in sicurezza.

- Recuperate immediatamente qualsiasi uccello abbattuto.

Per informazioni più dettagliate per un'efficace ed efficiente caccia agli uccelli selvatici, scaricate una copia del manuale *Be a better game bird hunter – Shotgunning Education Program (SEP) Handbook* (Come migliorare nella caccia agli uccelli selvatici – Programma di Educazione al Tiro col Fucile) dal sito gma.vic.gov.au

Considerate inoltre la frequenza di una giornata di training SEP sul campo, per fare pratica e ricevere il training da insegnanti esperti. Per ulteriori informazioni consultate il sito di *Field and Game Australia* o della *Sporting Shooters Association of Australia (Vic)*.

Uccidere uccelli vivi dopo il recupero y

Se recuperate un uccello abbattuto ancora vivo, è vostra responsabilità ucciderlo immediatamente quando lo recuperate.

Questo dovrebbe essere fatto in modo umano così da provocare dapprima l'immediatamente perdita dei sensi e quindi la morte, senza che l'animale riacquisti conoscenza.

Un metodo efficace è quello che utilizza *swatter loads* quando il loro utilizzo può avvenire in sicurezza.

Gli *swatter loads* sono carichi di pallini di piccole dimensioni che producono una rosata ricca a fitta densità, efficace nell'uccisione degli uccelli abbattuti.

Il tipico raggio di tiro per *swatter loads* è di 20-30 metri, e il calibro dei pallini d'acciaio più efficace è da #7 fino a #5 per 1 oncia/28g.

Ogni uccello recuperato ancora in vita deve essere tramortito con un unico colpo forte alla nuca sferrato con un oggetto pesante non appuntito, come una piccola mazza (es. annoccatore), quindi lo si deve uccidere immediatamente utilizzando un altro metodo accettabile.

Metodi accettabili includono dislocazione cervicale (rottura dell'osso del collo) o decapitazione (recisione del capo).

Soffocamento o annegamento non sono considerati metodi accettabili per l'uccisione degli uccelli.

L'annoccatore è un piccolo oggetto poco costoso che può essere acquistato online o presso i negozi di attrezzatura per la pesca e può essere portato facilmente sul campo.

Assicuratevi della morte dell'uccello controllando la combinazione dei seguenti segni:

- Le palpebre e le membrane dell'occhio non si chiudono se si tocca l'occhio dell'uccello
- Il corpo e il collo sono afflosciati; non c'è alcun movimento; le ali pendono
- Gli occhi si velano rapidamente dopo la morte
- Assenza di respirazione e di battito cardiaco

Conservazione e recupero della carne della selvaggina

È stata inoltre introdotta una nuova norma per formalizzare quella che è già pratica comune per la maggior parte dei cacciatori responsabili: usare e non sprecare la selvaggina cacciata.

Se un cacciatore decide di non tenersi e portarsi a casa l'intero uccello selvatico, il cacciatore dovrà però recuperare almeno entrambi i petti dell'uccello che ha recuperato.

I cacciatori dovranno rimanere in possesso dell'uccello o dei petti dell'anatra fino al momento immediatamente precedente la cottura o fino a quando non vengono portati a casa.

Ricordate che continuano ad essere in vigore le norme secondo cui i cacciatori devono lasciare almeno un'ala piumata completa attaccata all'anatra o ai petti dell'anatra. Se i petti vengono rimossi separatamente, ciascun petto deve avere un'ala completamente piumata attaccata. Se i petti sono uniti, è sufficiente una sola ala.

Domande Più Frequenti

Cosa si intende per 'ogni ragionevole sforzo per il recupero dell'uccello abbattuto'?

Il significato di sforzo ragionevole dipenderà dalle situazioni di caccia, dal luogo, dall'ambiente e dall'attrezzatura di caccia.

Il cacciatore che abbatte un uccello deve interrompere la caccia e fare immediatamente il possibile per recuperare l'uccello a piedi, in barca o con un cane da caccia, a meno che il recupero non sia pericoloso..

Le diverse condizioni dell'ambiente paludoso, come la vegetazione e la profondità delle acque, giocheranno un ruolo nella definizione di sforzo ragionevole.

Ad esempio, per un cacciatore a riva che abbatte un uccello in acque profonde, le possibilità di recupero immediato dell'uccello sono poche o nulle paragonato ad un cacciatore con cane da caccia o con una barca che può facilmente recuperare l'uccello abbattuto in acque profonde.

Per rendere più semplice il rispetto delle leggi e per limitare perdite e ferimenti occorre cacciare solo in aree dove sia possibile recuperare la selvaggina.

Anche il numero di cacciatori presenti in palude e la loro vicinanza l'uno all'altro (rischio di ferimento da pallini) e gli ostacoli visivi (fitta vegetazione sul terreno) sono fattori che contribuiscono alla determinazione di ciò che è ragionevole.

Il cacciatore che continua ad abbattere uccelli in piena vista (dove non c'è rischio collegato al recupero) e che non compie nessun tentativo per recuperare gli uccelli abbattuti tra un colpo e l'altro sarà quindi in palese violazione delle norme.

Posso sparare ad un altro uccello dopo aver abbattuto il primo?

No, a meno che non abbia già recuperato il primo uccello. Da cacciatore responsabile è suo compito mantenere gli occhi sull'uccello abbattuto per assicurarsi che venga recuperato e ucciso.

Cosa devo fare se l'uccello colpito continua a volare via?

L'obbligo di recupero vale solo per gli uccelli abbattuti. Per uccelli abbattuti si intendono quelli che sono stati portati a terra da uno sparo o quelli sparati mentre si trovavano a terra. Per 'terra' si intende terreno, acqua e qualsiasi vegetazione o altra cosa sulla terraferma o sull'acqua.

Posso ancora mantenere l'intero uccello o posso mantenere solo la carne del petto?

Sì, può ancora mantenere l'intero uccello. Tenere più della sola carne del petto è una pratica legale che viene incoraggiata. La carne del petto è il minimo che deve essere trattenuto.

Secondo le norme per la rimozione della carne del petto, i petti degli uccelli selvatici vanno rimossi sul campo?

No. Le norme richiedono che vengano prelevati **almeno entrambi i petti**. Può ancora rimuoverne più parti o portare l'intero uccello a casa, o nel luogo dove lo cucinerà, e procedere al prelievo in quel luogo..

Devo ancora conservare un'ala completamente piumata?

Sì. Le leggi vigenti continuano ad essere in vigore e richiedono che i cacciatori conservino

Se il mio cane da caccia è a metà strada per il recupero di un capo, posso sparare ad un'anatra di passaggio o a uccelli da richiamo?

Se il cane ha recuperato l'uccello e sta tornando indietro, lei ha compiuto uno sforzo ragionevole per il recupero dell'uccello abbattuto. Tuttavia si raccomanda che il recupero sia completo e che l'uccello sia da voi prima che riprendiate a sparare..

Non renderò visibile il mio nascondiglio, perdendo l'opportunità di sparare ad altri uccelli, se devo interrompermi per recuperare immediatamente un'anatra selvatica?

Da cacciatore responsabile, la sua priorità è assicurarsi che l'uccello al quale ha sparato sia morto e recuperato (cioè che non vada perduto). Se non vuole render noto il nascondiglio, consideri l'utilizzo di un cane da caccia ben addestrato che le permetterebbe di stare nascosto mentre dà gli ordini al cane per il recupero.

Cosa succede se non recupero immediatamente la selvaggina abbattuta?

Infrange le nuove norme che richiedono il recupero immediato e potrebbe essere passibile di multa o perseguibile.

Posso chiedere ad un amico di recuperare l'uccello abbattuto?

Sì. Se l'amico, munito di Licenza di Caccia alla Selvaggina, è più vicino all'uccello abbattuto è ammesso che lo recuperi per lei per assicurare che l'uccello non vada perduto e per uccidere prima possibile eventuali uccelli feriti.

almeno un'ala completamente piumata attaccata all'anatra o ai petti dell'anatra. Se si rimuovono i petti separatamente, deve rimanere un'ala completamente piumata attaccata a ciascun petto

Le nuove norme valgono anche per la Quaglia delle Stoppie?

Sì. Le norme valgono per tutti gli uccelli selvatici (es. anatre selvatiche, Quaglia delle Stoppie e specie di selvaggina introdotte come fagiani e pernici)

Cosa succede se inavvertitamente abbatto più uccelli con un solo colpo?

Evitando di sparare in mezzo ad uno stormo diminuiranno le probabilità di ferire più di un uccello. Si concentri sempre a sparare su uccelli gregari, ai lati o che volano da soli.

Se colpisce più di un uccello, si concentri sul recupero di quello che si può raggiungere più facilmente e cerchi di farsi una mappa mentale di dove sia caduto l'altro così da poterlo cercare una volta recuperato e ucciso il primo uccello..

Qual è il tempo considerato ragionevole per la ricerca di un uccello abbattuto?

Dovrebbe essere compiuto uno sforzo ragionevole per il recupero degli uccelli abbattuti. La durata della ricerca sarà influenzata da molti fattori, inclusi la sicurezza personale e il grado di difficoltà per avere accesso all'uccello abbattuto.

Quali sono le sanzioni previste dalle nuove norme?

Entrambe le norme prevedono sanzioni massime di 20 punti, o circa \$3.160 (un punto di penalità vale circa \$158 alla data di stampa). C'è inoltre il rischio di perdere la Licenza di Caccia alla Selvaggina e le eventuali attrezzature utilizzate quando si commette il reato..